



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

CLOBETAZOL PROPIONATO

Identificação

Formula Molecular: C₂₅H₃₂CIFO₅

PM: 466,97

DCB: 02247

CAS: 25122-46-7

Propriedades:

É um adrenocorticoide fluorado com alto grau de atividade glicocorticoide e grau baixo de atividade mineralocorticoide. Usado na forma de propionato, por via tópica, as áreas ideais para o seu uso são as de pele grossa como cotovelos, joelhos, palmas das mãos e planta dos pés.

Indicação e Ação Farmacológica

Alopecia circunscrita; dermatite atópica grave; dermatite esfoliativa generalizada; dermatite numiforme grave; dermatose inflamatória grave; eczema grave; granuloma anular; quelóide associado à prurido; líquen plano, crônico e estriado; lupo eritematoso discóide e cutâneo subagudo; penfigóide e pênfigo; psoríase; psoríase; eritema solar; estomatite aftosa.

Os efeitos antiinflamatórios incluem inibição do processo inicial tais como edema, deposição de fibrina, dilatação vascular, migração e atividade fagocitária. Processos tardios, como a deposição de colágeno e a formação de quelóide, também são inibidos pelos adrenocorticóides.

É absorvido através do estrato córneo. A absorção aumenta quando aumenta a potência ou quando o uso for prolongado

Dose e Uso

Creme ou pomada (0,05%) – espalhar sobre a pele 2 ou 3x/dia.

Solução capilar (0,05%) – aplicar sobre o couro cabeludo 2x/dia.

Reações adversas

A absorção percutânea causa hiperglicemia, glicosúria e supressão do eixo ad-renal-pituitário-hipotalâmico;

Outros efeitos: adormecimento dos dedos, atrofia da pele, dermatite de contato, foliculite, furunculose, hiperestesia, infecção secundária da pele, irritação retal, pioderma, púrpura, pústulas, telangiectasia, vesiculação.

Precauções

- Os tratamentos devem ser de curta duração;
- Ao menor sinal de resposta clínica favorável, suspender a administração.
- O uso prolongado pode desencadear reações de taquifilaxia.
- Não usar nos olhos ou ao redor deles. Não usar atadura ou faixa na área tratada, a não ser por orientação médica
- O risco/benefício deve ser avaliado em situações clínicas como: infecções locais em tratamento, intolerância aos adrenocorticóides, atrofia da pele, catarata, diabetes melito, glaucoma, tuberculose.

Superdosagem: O tratamento prolongado pode dar origem, particularmente em crianças, a supressão reversível do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, deven-



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 10 50 08



www.purifarma.com.br



grupopurifarma



Purifarma

do por isso ser reavaliado semanalmente.

Interações

Não descrito na literatura.
Incompatibilidade com Álcalis

Contra-Indicações

- Rosáceos, acne e dermatite perioral, lesões cutâneas conseqüentes de infecções por vírus, fungos ou bactérias.
- Hipersensibilidade à droga.
- Dermatoses em crianças menores de 12 anos de idade.

Referências

1. MARTINDALE. The Complete Drug Reference. 35. Ed. PHP: Londres, 2007.
2. DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014

