



Purifarma



São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825



www.purifarma.com.br



[grupopurifarma](#)



Purifarma



purifarma.com.br/Blog

TRIMEBUTINA MALEATO

CAS: 3414059-5

DCB: 08910

Fórmula Molecular: C₂₆H₃₃NO₉

Peso Molecular: 503,54

Composição: Não aplicável.

Uso: Oral

O maleato de trimebutina tem sido usado para o tratamento de distúrbios gastrointestinais funcionais, incluindo a síndrome do intestino irritável (SII). É considerada multifuncional. Acreditava-se que o efeito principal estava associado à sua atividade antiespástica, mas evidências posteriores expandiram o reconhecimento de um impacto mais amplo no trato gastrointestinal.

Além disso, demonstrou ter um papel na regulação da sensibilidade visceral. Foi observado que este medicamento também é um modulador de múltiplos canais iônicos no intestino. Sua função em vários níveis, da motilidade ao controle da dor, torna este medicamento único e seu espectro de ação pode ser explorado para o tratamento de distúrbios de hipermotilidade e hipomotilidade, incluindo síndrome do intestino irritável e outras doenças gastrointestinais funcionais.

Exerce ação analgésica e reguladora da atividade intestinal anormal acelerando o esvaziamento gástrico e modulando a atividade contrátil do intestino. Sua ação mais específica é sobre o trato digestivo.

INDICAÇÕES

- Síndrome do intestino irritável;
- Dispepsia;
- Íleo paralítico no pós-operatório;
- Processos inflamatórios anais;
- Fissura anal.

DOSAGEM SUGERIDA

- **Oral:** 400 a 600 mg ao dia, em duas ou três tomadas. A dose máxima recomendada é de 600 mg.
- **Tópico:** não aplicável.
- **Fator de correção:** verificar no certificado de análise.

ADVERTÊNCIAS

O seu uso não está autorizado para menores de 12 anos, gestantes e lactantes. Em caso de hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação, interromper o uso do produto e consultar o médico.



Purifarma

EFEITOS ADVERSOS

As reações adversas previstas são: sensação de queimação local, eritema cutâneo, sonolência, cefaleia, tontura, fraqueza, boca seca, constipação, diarreia, náuseas, vômitos e leucopenia.

REFERÊNCIAS

1. Salvioli B. Trimebutine: a state-of-the-art review. Minerva Gastroenterol Dietol. 2019 Sep;65(3):229-238. doi: 10.23736/S1121-421X.19.02567-4. PMID: 31617696.
2. Trimebutine: abuse, addiction and overdose. Prescrire Int. 2013 Oct;22(142):241-2. PMID: 24298588.
3. Aktas A, Caner B, Ozturk F, Bayhan H, Narin Y, Mentes T. The effect of trimebutine maleate on gastric emptying in patients with non-ulcer dyspepsia. Ann Nucl Med. 1999 Aug;13(4):231-4. doi: 10.1007/BF03164897. PMID: 10510878.
4. DTG, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2013/2014. Informações bula disponibilizada pela Anvisa

São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825

www.purifarma.com.br

[grupopurifarma](#)

Purifarma

purifarma.com.br/Blog

Rev.1 – 14/02/2025.